



# 麻疹免疫



有效的麻疹预防接种已经存在了40多年了。2002年全球估计有75%的一岁婴儿注射了预防这种高感染疾病的疫苗。麻疹有很多种，有些只是造成轻微不适，有的可以致命，营养不良的以及生活在医疗健康条件差的地区的人（这也阻碍了免疫接种任务的开展）通常都是容易患上麻疹的高危人群

2002年，接种麻疹疫苗人口最多的地区是印度，中国和美国。未接种麻疹婴儿数量最多的国家和地区也有印度和中国，以及尼日利亚。

各地区的面积大小反映了全球儿童接种麻疹疫苗的在该地区的比例。




土地面积

拥有最低麻疹接种率的国家和地区

排序	国家和地区	数值	排序	国家和地区	数值
181	乍得	55	191	尼日尔	48
181	老挝	55	192	几内亚比绍	47
181	加蓬	55	192	东帝汶	47
184	几内亚	54	194	布基纳法索	46
184	塞内加尔	54	195	刚果民主共和国	45
186	海地	53	196	万那杜	44
187	埃塞俄比亚	52	197	尼日利亚	40
187	柬埔寨	52	198	刚果	37
189	赤道几内亚	51	199	中非共和国	35
190	苏丹	49	200	马里	33

儿童接种麻疹疫苗的比例

麻疹预防接种



技术提示  
 \* 数据来源于联合国发展计划的2004年人类发展报告;  
 \* 有关麻疹的信息来源于世界卫生组织的一个麻疹现状报表;  
 \* 请参考本网站中的更多详细信息。

“Wisdom and knowledge are power so vaccinate your children against measles!” (“智慧和知识都很强大，所以请给你的孩子接种疫苗，抵抗麻疹！”)

Maison Chansa, 2006