

# 糖尿病的患病率




The University of Sheffield



The Leverhulme Trust




Produced by the SASI group (Sheffield) and Mark Newman (Michigan)



糖尿病类型有两种，都与调节血糖水平的胰岛素有关。患有I型糖尿病意味着你的身体无法产生足够的胰岛素，因此该类患者就必须注射胰岛素。更普遍的是II型糖尿病，这种情况下患者的身体无法正确利用胰岛素 - 这种类型的糖尿病可以通过调整饮食和服药治疗，怀孕期间可能患上此类型糖尿病。

北美地区的糖尿病发病率最高。在整个北美地区的糖尿病患者中，4%居住在加拿大，33%在墨西哥，62%在美国。2001年拥有最庞大的糖尿病患者总数的国家是印度：共有五千六百万。

各地区的面积大小反映了全球15岁以上人群中的糖尿病患者在该地区的分布比例。



土地面积

技术提示


- \* 数据来源于世界银行的2005年世界发展指标；
- \* 本图关于20-79岁患有糖尿病的比例是在基础人口只包括15周岁以上总人口数的基础上计算出来的；
- \* 请参考本网站中更多详细信息。

最高和最低糖尿病患病率的国家和地区

排序	国家和地区	数值	排序	国家和地区	数值
1	墨西哥	14	190	刚果	0.9
2	特立尼达和多巴哥	14	192	象牙海岸	0.8
3	沙特阿拉伯	12	192	塞内加尔	0.8
4	毛里求斯	12	192	乌干达	0.8
4	中国香港	12	192	喀麦隆	0.8
6	巴布亚新几内亚	12	196	尼日利亚	0.4
7	古巴	12	196	加纳	0.4
8	波多黎加	11	198	马里	0.3
8	新加坡	11	198	甘比亚	0.3
10	牙买加	11	198	多哥	0.3

2001年20-79岁人群中糖尿病患者的百分比\*

糖尿病患病率



“Diabetes is responsible for over one million amputations each year. It is a major cause of blindness. It is the largest cause of kidney failure in developed countries and is responsible for huge dialysis costs.” ( “每年糖尿病都与超过百万例的截肢有关。它是导致失明的一个主要因素，在发达国家里它也是导致肾功能衰竭的最大原因，并与巨额的透析费用相关联。” ) Unite For Diabetes, 2006